

*Under behandlingen avger blodigeln upprepade gånger sina värdefulla aktiva ämnen.*

*Dessa inkluderar hirudin, calin, bdellin och egelin samt organas och acetylkolin. De har en antiöagulerande, antiinflammatorisk, cirkulationsfrämjande och vävnadslösande effekt.*



*På grund av dessa egenskaper används blodigelterapi för alla tillstånd där man vill främja blodcirkulationen, minska trängsel och stimulera vävnadernas ämnesomsättning.*

*Även om behandling med blodiglar beskrivs som mycket lite biverkning kan oönskade effekter inte helt uteslutas. I enskilda fall kan det handla om allergiska reaktioner mot*

*blodigelspottet eller en lokal inflammation i bettsåret, vilket är ytterst sällsynt.*

*Ett litet ärr kan finnas kvar på själva bettstället, men det täcks av pälsen.*

*Behandlingen bör inte användas på djur som är undernärda eller lider av anemi. Hästar med tumörer, magsår eller feber är inte heller lämpliga.*

*Vissa mediciner som påverkar blodöagulationen bör avbrytas under en kort tid.*

*Om hästen är uppenbart rastlös använder jag en akupunktur nål för att "lugna" hästen.*

*Allt gott för dig och ditt husdjur.....*

*efter överenskommelse*

[Elkegiesin@web.de](mailto:Elkegiesin@web.de)

[www.elkegiesin.de](http://www.elkegiesin.de)

Stockholmsvägen 60

57280 Målilla

+49 174 961 18 40 +46 70 224 79 34

## *Terapi med blodiglar för hästen*



## *Elke Giesin*

*Naturläkare*

*för djuren och deras människor*

*Klassisk homeopati, certif. Blutegeltherapeut -  
Hirupunktur, radiestesi, Schuessler-salter*

*Bachblommor enligt Dr. Edward Bach,  
certifierad Horvi-enzymterapeut för människor och djur.*

*certifierad näringsexpert*

*specialiserad på "hundar och katter*

*certifierad specialist på diabetes hos hundar och katter*

*Akupunkturplåster från Lifewave*

## Proceduren för behandling med blodigel

För att förbereda sig för leechterapi kan det vara nödvändigt att avbryta vissa mediciner några dagar i förväg. Du kommer att få detaljerad information om detta i varje enskilt fall. Blodiglar gillar dock inte eteriska oljor, så ingen flugspray eller liknande bör användas före behandlingen. Utfodring med vitlök eller ingefära kan också ha en avskräckande effekt på blodiglarna och bör därför avbrytas under en kortare tid. Dofter i hygienprodukter har samma effekt, så dessa bör inte användas på behandlingsdagen eller dagen innan.

Din häst förs till en relativt lugn plats i stallen för behandling, där den kan vara löst bunden. Den kan också hållas löst av ägaren.

Vid applicering av blodiglar ska området som ska behandlas vid behov rakas. Om håret är längre är det delat. Sedan placeras blodiglarna på motsvarande områden.

Efter att de har sugits in väntar man på blodiglarna (ca 2 timmar) tills de släpper sig själva.



Från och med nu fortsätter såret att blöda i mellan 2 och 12 timmar. Detta är en del av effekten av behandlingen och bör inte avbrytas.

Därför bandageras inte såret, utom i särskilda fall. Djuren tycker inte att detta är störande och såret sluter sig självt omedelbart efter att blödningen har upphört.

Ibland uppstår en lätt klåda, som då kan behandlas med en gel eller salva.

Strax efter behandlingen

Du bör märka en förbättring av symtomen.

Beroende på användningsområde kan ett annat antal behandlingsbesök vara nödvändiga.

I akuta fall räcker det oftast med 1-2 behandlingar, i kroniska fall betydligt fler.

## Typiska användningsområden

- ❖ Kroniska degenerativa processer som spavin, skäl eller andra artroser.
- ❖ Artrit
- ❖ Laminit
- ❖ Inflammation i hovrullen
- ❖ Seninflammation eller skada på senan
- ❖ Ödem
- ❖ Inflammatoriska processer, t.ex. abscesser eller bölder.
- ❖ Eksem
- ❖ Skador orsakade av bett och sparkar
- ❖ Andra skador, inklusive kirurgisk behandling
- ❖ Hematom
- ❖ Sår som läker dåligt
- ❖ Inflammationer i bröstkörteln, förhuden och testiklarna.
- ❖ Behandling av ärr